

UN



DOBLE GOLPE

A LAS ARAÑUELAS



INSECTICIDAS DE CALIDAD SUPERIOR



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR!

DOKTOR DOOM
SPIDER MITE KNOCK OUT
Insecticide Plant Spray

Tomatoes and Vegetables
Sprays in all directions
PROVIDES RAPID CONTROL
MAY BE USED ON FOOD CROPS
WITHIN ONE DAY OF HARVEST
ACTIVE INGREDIENT:
Pyrethrins 0.20%
OTHER INGREDIENTS 99.80%
NET CONTENTS: 16oz.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION

LA DEFENSA EVOLUTIVA DE LAS ARAÑUELAS

1. Las arañuelas ponen huevos cuando se las trata con un aerosol que las mata. **Doktor Doom** las mata, por lo que ponen huevos antes de morir.
2. Los ambientes de cultivo en interiores e invernaderos ofrecen las condiciones ideales para la reproducción rápida de las arañuelas; cada 3-4 días nace un nuevo ciclo de vida. Para reducir esta frecuencia, mantenga los niveles de humedad debajo del 50%.
3. Para lograr la completa erradicación, siga todos los pasos y aplique **Doktor Doom Spider Mite Knock Out** cuidadosamente, en la parte inferior de las hojas, seguido de una nebulización con **Doktor Doom**.
4. Debido a su rápida evolución, se espera que alcance el éxito total en la erradicación si aplica estos productos cada 3-4 días, entre 3 y 4 veces.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN DE DOKTOR DOOM SPIDER MITE KNOCK OUT

1. Riegue sus plantas antes de la aplicación.
2. Aplique siempre cuando esté oscuro, por la noche o por la mañana; nunca con la luz directa del sol o con luces HID encendidas (lo ideal es aplicarlo con temperaturas inferiores a los 75 °F/22 °C). Apague los ventiladores y extractores de aire.
3. Se recomienda utilizar una máscara antipolvo en ambientes cerrados.
4. Es necesario que el aerosol haga contacto con el insecto para matarlo.
5. Asegúrese de quitar manualmente todas las telarañas que vea antes de tratar. Las telarañas funcionan como una sombrilla y evitan que el aerosol llegue a la planta.
6. **Doktor Doom Spider Mite Knock Out** están equipados con una válvula especial que rocía en posición invertida.
7. **Doktor Doom Spider Mite Knock Out** y **Foggers** son aerosoles de CONTACTO; el aerosol debe hacer contacto con el ácaro para matarlo.
8. Rocíe la parte inferior del follaje desde una distancia de 1 metro aproximadamente de la planta.

9. Rocíe con ráfagas cortas de 1-2 segundos por vez. Solo se requiere una niebla liviana. **NO EMPAPE EL FOLLAJE** (Empapar el follaje provocará quemaduras en las hojas)
10. Rocíe el área con **Doktor Doom Foggers** después de aplicar **Spider Mite Knock Out**.
11. Lávese las manos después de usar cualquier producto insecticida.
12. **Doktor Doom Spider Mite Knock Out** está hecho con piretrina natural y es seguro para usarlo hasta un día antes de la cosecha.
13. La piretrina natural se degrada biológicamente en cuestión de horas después de la exposición a la luz, el aire y la humedad. No deja residuos.
14. La piretrina mata cientos de insectos, trips, jejenes micóticos, moscas blancas, pulgones, cochinilla y otras plagas comunes masticadoras de hojas.
15. La piretrina está aprobada para uso en programas de jardinería orgánica (usos limitados). Consulte al OMRI.

CONSEJOS DE HIGIENIZACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO EN INTERIORES E INVERNADEROS

1. Al trabajar en su ambiente de cultivo, use siempre ropa limpia.
2. Asegúrese de mantener estas prendas limpias. Lávelas en agua caliente y séquelas en secadora con calor periódicamente.
3. No permita que las mascotas ni sus amigos entren a su ambiente de cultivo; las arañuelas pueden adherirse a cualquiera de ellos.
4. Retire las hojas muertas del área de cultivo diariamente.
5. Si está tomando "aire fresco" para que ingrese a su ambiente de cultivo, asegúrese de tratar el área exterior de donde proviene el aire con **Doktor Doom** en forma periódica y use un filtro de micropartículas en la entrada de aire.
6. La limpieza es un componente clave; mantenga todo limpio diariamente.

DOKTOR DOOM! CONSEJOS DE APLICACIÓN DEL NEBULIZADOR

PREPARACIÓN ANTES DE NEBULIZAR

1. Apague las lámparas piloto y las llamas abiertas en el área que va a nebulizar; esto incluye hornos, tanques de agua caliente, quemadores de CO₂, etc.
2. Apague los extractores de aire, equipos de aire acondicionado y ventiladores de circulación.
3. Apague los artefactos automatizados con ciclos de ENCENDIDO y APAGADO. Esto incluye temporizadores, controladores de CO₂, etc.
4. Cierre todas las ventanas y puertas en el área de cultivo.
5. Riegue sus plantas antes de la aplicación.

CONSEJOS DE APLICACIÓN DEL NEBULIZADOR DOKTOR DOOM

1. Use en viveros particulares y otras áreas de cultivo en interiores.
2. Use hasta un día antes de cosechar vegetales, flores y plantas ornamentales.
3. Una onza (28,35 g) fumiga – nebuliza 1000 pies cúbicos (28,31 l): ancho x largo x altura = pies cúbicos.
4. Siempre nebulice en la oscuridad, no use en con la luz directa del sol o con las luces HID encendidas.
5. La temperatura ideal de aplicación es inferior a 75 °F o 22 °C.
6. Los mejores resultados se obtienen si se usa de 2 a 3 horas después de apagar la luz o 2 a 3 horas después del atardecer.
7. Siempre trate la parte inferior de las hojas con **Doktor Doom Spider Mite Knock Out** antes de Nebulizar.
8. **Doktor Doom Spider Mite Knock Out** y **Foggers** son aerosoles de contacto; el aerosol debe hacer contacto con el ácaro para matarlo.

NEBULIZACIÓN

1. Es necesario elevar las pantallas de iluminación a la máxima altura o retirarlas del área de cultivo.
2. Apoye los nebulizadores en un balde de 5 galones (20 l).
3. No permita que la niebla entre en contacto directo con las plantas. Está diseñada para subir por el aire y caer sobre las plantas.
4. Oprima la válvula para llevarla a la posición de bloqueo, salga del área inmediatamente y cierre la puerta detrás de usted.
5. Abra todas las puertas y ventanas, encienda los extractores de aire, los ventiladores de circulación para sacar el aire del área por lo menos durante media hora antes de comenzar a trabajar en el área. El vivero o el área en interiores deberán estar idealmente a una temperatura de 22 °C/75 °F. Los ácaros son más activos a esta temperatura, así como los productos de **Doktor Doom**.
6. Vuelva a ingresar al área por lo menos 2 horas después del tratamiento. Cuanto más perdure el olor de la piretrina en el área de cultivo, más efectivo será el tratamiento. Antes de comenzar a trabajar en el área, abra las ventanas y puertas para ventilar y encienda los ventiladores de circulación y extractores de aire durante al menos 30 minutos.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR!

DOKTOR DOOM
NEBULIZADOR
de Liberación Total

PARA EXTERMINAR Ácaros, Ácaros de dos Puntos, Pulgones, Moscas Blancas, Piojillos de la Cebolla, Mosquitas de los Hongos, Chinchas Harinosas y Cochinillas

SOLO PARA USO RESIDENCIAL/DOMÉSTICO PUEDE USARSE EN: Invernaderos Domésticos • Áreas de Almacenamiento de Frutas y Vegetales • Todos los Cultivos • Vegetales • Plantas y Flores Ornamentales • Frutas y Vegetales Después de la Cosecha

No contiene CPC ni otras sustancias nocivas para la salud humana. Las regulaciones Federales prohíben las importaciones de OC en los Estados Unidos.

TIEMPOS PARA REINGRESAR

CANADÁ	EE.UU.
70 GRAMOS - 2 hrs	3 oz. - 2 hrs
150 GRAMOS - 2 hrs	5,5 oz. - 2 hrs
400 GRAMOS - 2 - 3 hrs	12,5 oz. - 2 - 3 hrs

DOKTORDOOM.COM

